

Österbotten: Ändringar i kemiundersökningar fr.o.m. 29.3.2023

Undersökningssortimentet och referensintervallen harmoniseras 29.3.2023 i samband med övergången till gemensam mellanprogramvara.

1029 U -Alb	Albumin, urin	
Referensintervall	under 25 mg/l	
3134 dU-Alb	Albumin, dygnsurin	
Referensintervall	under 30 mg	
4511 U -AlbKre	Förhållandet mellan albumin och kreatinin	
Referensintervall	≥ 17 år: under 3 mg/mmol	
4593 P -Bil-Kj	Bilirubinkonjugat	
Referensintervall	under 30 dagar	≤ 10 µmol/l
	1 - 11 mån	≤ 4 µmol/l
	≥ 1 år	≤ 5 µmol/l
2011 dU-Ca	Kalcium, dygnsurin	
Referensintervall	0 - 2 år	0.5 - 2.0 mmol
	3 - 16 år	1.3 - 4.0 mmol
	≥ 17 år	1.3 - 6.5 mmol
Tolkning	Risken för bildning av njurstenar ökar när avsöndringen per dygn är över 5 mmol hos kvinnor och över 6.3 mmol hos män.	
9612 U -CaKre	Förhållandet mellan kalcium och kreatinin, urin (ny undersökning)	
Referensintervall	under 1 år	≤ 2.2 mmol/mmol
	1 år	≤ 1.5 mmol/mmol
	2 år	≤ 1.4 mmol/mmol
	3 - 4 år	≤ 1.1 mmol/mmol
	5 - 6 år	≤ 0.8 mmol/mmol
	7 - 17 år	≤ 0.7 mmol/mmol
	≥ 18 år	≤ 0.6 mmol/mmol
2027 S -Karba	Karbamazepin	
Referensintervall	terapeutiskt intervall 17 - 50 µmol/l	
4600 P -Krea	Kreatinin	
Referensintervall	0 - 14 dygn	35 - 86 µmol/l
	15 dygn - 1 år	15 - 38 µmol/l
	2 - 4 år	24 - 43 µmol/l
	5 - 11 år	33 - 59 µmol/l
	12 - 14 år	45 - 77 µmol/l
	flickor/kvinnor, ≥ 15 år	50 - 90 µmol/l
	pojkar/män, ≥ 15 år	60 - 100 µmol/l

2146 Pt-Krea-CI	Kreatininclearance	
	Undersökningen utgår på grund av litet behov, och ersätts med 4600 P -Krea och 1887 S -KysC.	
2451 S -Paras	Paracetamol	
Referensintervall	Förgiftningsundersökning, det allmänna terapeutiska området är 65 - 165 µmol/l.	
2519 U -Prot	Protein, urin	
Referensintervall	under 0.10 g/l	
4831 P -TSH	Tyreotropin	
Referensintervall	0 - 6 dagar	0.7 - 20.0 mU/l
	7 dagar - 3 mån	0.7 - 12.7 mU/l
	4 - 12 mån	0.7 - 8.9 mU/l
	1 - 6 år	0.7 - 5.9 mU/l
	7 - 11 år	0.6 - 4.7 mU/l
	12 - 19 år	0.5 - 4.2 mU/l
	20 - 59 år	0.5 - 4.0 mU/l
	60 - 69 år	0.5 - 4.3 mU/l
	70 - 79 år	0.5 - 5.9 mU/l
	≥ 80 år	0.5 - 7.5 mU/l

Tilläggsinformation

Instruktionerna för förberedelse inför sköldkörtelundersökningar preciseras samtidigt så att endast sidan P - T4-V innehåller anmärkningen "Om thyroxinmedicinering används ska dagens dos tas efter provtagningen. Karbimazol och propyltiouracil kan tas normalt före provtagningen."

Se den elektroniska laborariehandboken för noggrannare information om undersökningar och tolkning: fimlab.fi/ohjekirja.

Förfrågningar

Kundrådgivning för professionella i Österbotten, tel. 041 7314 786

Auni Collings, direktör för specialområdet kemi