

Poängsättning av blödningssymptom. Sammanlagt ≥ 4 poäng hos män, ≥ 6 poäng hos kvinnor och ≥ 3 poäng hos barn tyder på en avvikande blödningstendens.

Symptom	Poängsättning				
	0	1	2	3	4
Näsblod	Nej eller obetydliga	> 5 / år eller varar > 10 min	Läkarbesök	Tamponering, bränning, antifibrinolytika	Blodtransfusion, DDAVP, substitutionsbehandling
Anlag för blåmärken	Nej eller obetydligt	> 5 per gång	Läkarbesök	Omfattande blåmärken	Blodtransfusion, DDAVP, substitutionsbehandling
Små sår blöder	Nej eller obetydligt	> 5 / år eller varar > 10 min	Läkarbesök	Kirurgiska åtgärder	Blodtransfusion, DDAVP, substitutionsbehandling
Blödningar i munhålan	Nej eller obetydliga	Ja	Läkarbesök	Kirurgiska åtgärder, antifibrinolytika	Blodtransfusion, DDAVP, substitutionsbehandling
Blödning efter tandutdragning	Nej / obetydligt / inga utdragningar	$\leq 1/4$ av operationer, ingen behandling	> $1/4$ av operationer, ingen behandling	Nya stygn, tamponering	Blodtransfusion, DDAVP, substitutionsbehandling
Blödning under / efter operationer	Nej / obetydligt / inga operationer	$\leq 1/4$ av operationer, ingen behandling	> $1/4$ av operationer, ingen behandling	Kirurgiska åtgärder, antifibrinolytika	Blodtransfusion, DDAVP, substitutionsbehandling
Blod i urinen	Nej eller obetydligt	Synligt blod i urinen	Läkarbesök	Kirurgiska åtgärder, järnbehandling	Blodtransfusion, DDAVP, substitutionsbehandling
Blödningar i mag-tarmkanalen	Nej eller obetydliga	Spontan blödning	Läkarbesök	Kirurgiska åtgärder, antifibrinolytika	Blodtransfusion, DDAVP, substitutionsbehandling
Blödningar i musklerna	Nej	Efter skada, ingen behandling	Utan skada, ingen behandling	DDAVP, substitutionsbehandling	Kirurgiska åtgärder, blodtransfusion
Blödningar i lederna	Nej	Efter skada, ingen behandling	Utan skada, ingen behandling	DDAVP, substitutionsbehandling	Kirurgiska åtgärder, blodtransfusion
Blödningar i centr. nervsystemet	Nej	-	-	Subdural blödning (SDH)	Hjärn- el. subarachnoidal blödning (ICH, SAH)
Andra blödningssymptom	Nej eller obetydliga	Ja	Läkarbesök	Kirurgiska åtgärder, antifibrinolytika	Blodtransfusion, DDAVP, substitutionsbehandling
Rikliga menstruationer	Nej eller obetydligt	- Läkarbesök - Byte av mensskydd med < 2 t. mellanrum - Koagel i blodet	- Frånvaro från skolan / jobbet > 2 gånger / år - Antifibrinolytika, P-piller, järnbehandling	- Antifibrinolytika SAMT P-piller - Mensen har alltid varit rikliga	- Sjukhusvård - Blodtransfusion, DDAVP, substitutionsbehandling - Kirurgiska åtgärder
Avvikande blödning under / efter förlossning	Nej / obetydligt / inga förlossningar	- Läkarbesök - Varar över 6 veckor	Järnbehandling, antifibrinolytika	Blodtransfusion, DDAVP, substitutions-behandling, skrapning	Uterektomi, livmoderartärembolisering

Baserat på ISTH Bleeding Assessment Tool (ISTH BAT) -formulären.

http://c.ygcdn.com/sites/www.isth.org/resource/resmgr/ssc/isth-ssc_bleeding_assessment.pdf